

Por pérdidas
Carencial
Enf. Crónicas

Tratamiento:

- PHP 1000 de SF y 500 ml dxt 5%, dieta general, ceftriaxona 1 g c/12 hs, claritromicina 500 mg c /12 hs (finalmente no se indico claritromicina), heparina 5000 U SC c/ 12 hs, NBZ con 20 gotas de salbutamol c/ 6 hs, heparina 5000 u sc c 12 hs, bolo de 5000 u inicial y BIC de heparina de 20000 ui en 500 sf a 32 ml hora, CSV y diuresis.

Evolución:

Primer día de internación (17/06/04): Paciente vigil, mal estado general, taquipneico, Glasgow 10/15; sin entrada de aire en hemitx derecho. Se realiza pleurocentesis. Se obtiene líquido cetrino. Luego del procedimiento el paciente presenta paro cardiorrespiratorio. Se constata óbito a las 14:30 hs. La familia autoriza la realización de la autopsia.

	16/6
Hto	35-hb 11
GB	11500
Fórmula	74/0/0/21/7
Glucosa	0.9
Urea	0.8
Na	137
K	3.6
Ph	7.56
PCO2	30
PO2	100
Bicarbonato	25.6
Saturación O2	98%
FIO2	50%
tp	11.2
kptt	30